

ดูกันได้...ทำใจดี ?


ไม่ใช่แต่...หน้าร้อน



โรคพิษสุนัขบ้าคืออะไร ?

โรคพิษสุนัขบ้าหรือโรคกลัวน้ำ เป็นโรคติดต่อร้ายแรงชนิดหนึ่ง เกิดจากเชื้อไวรัสชื่อ เรบีส์ ไวรัส (Rabies) ทำให้เกิดโรคได้ในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมทุกชนิด เช่น คน สุนัข แมว ลิง ชะนี กระรอก ค้างคาว ฯลฯ โรคนี้เมื่อเป็นแล้วจะทำให้มีอาการทางประสาท โดยเฉพาะระบบประสาทส่วนกลาง และถ้าเป็นแล้วเสียชีวิตทุกราย ในปัจจุบันยังไม่มียาอะไรที่จะรักษาโรคพิษสุนัขบ้าได้

หมาบ้า...เป็นอย่างไร ?



คนติดโรคพิษสุนัขบ้าจากทางใดได้บ้าง ?

คนเป็นโรคพิษสุนัขบ้าเนื่องจากได้รับเชื้อโรคพิษสุนัขบ้าจากสัตว์ที่เป็นโรคได้ 2 ทางคือ

1. ถูกสัตว์ที่เป็นโรคกัด เชื้อไวรัสจากน้ำลายของสัตว์ที่เป็นโรคจะเข้าสู่ร่างกายทางบาดแผลที่ถูกกัด

2. ถูกสัตว์ที่เป็นโรคเลีย โดยปกติคนถูกสัตว์ที่เป็นโรคเลียจะไม่ติดโรคจากสัตว์เหล่านั้น นอกเสียจากว่าบริเวณที่ถูกเลียจะมีบาดแผลหรือรอยคลอกหรือรอยขีดข่วน โดยคนนั้นไม่ได้สังเกต ในการณ์นี้จะทำให้สามารถเป็นโรคพิษสุนัขบ้าได้ รวมทั้งถูกเลียที่ริมฝีปากหรือนัยน์ตา

คนที่เป็นโรคพิษสุนัขบ้า จะมีอาการอย่างไร ?

ในระยะ 2-3 วันแรก อาจมีไข้ต่ำๆ ต้อไปจะมีอาการเจ็บคอ เมื่ออาหาร อ่อนเพลีย คันหรือปวดแสบปวดร้อนบริเวณแผลที่ถูกกัด หั้ง ๆ ที่แผลอาจหายเป็นปกติแล้ว ต่อไปจะมีอาการดีนเด่นง่ายกระสับกระส่าย "ไม่ชอบแสงสว่าง ไม่ชอบลม และไม่ชอบเสียงดัง กลืนลำบาก แม้จะเป็นของเหลวหรือน้ำ เจ็บมาก เวลากลืน เพาะภาระเกร็งตัวของกล้ามเนื้อที่ใช้ในการกลืน แต่ยังมีสติพุ่ดชา รู้เรื่อง ต้อไปจะ恐慌มากขึ้น และสุดท้ายอาจมีอาการขึ้ก เป็นอัมพาต หมดสติ และเสียชีวิต เนื่องจากส่วนที่สำคัญของสมองถูกทำลายไปหมด



ข้อควรปฏิบัติภายหลังจากถูกสุนัขบ้า หรือสัตว์ที่สงสัยว่าบ้ากัด

1. ล้างแผลทันทีด้วยน้ำสะอาด พอกด้วยสนูฟ 2-3 ครั้ง และทาแผลด้วยน้ำยาพิวิดิน (เบตาดีน) หรือแอลกอฮอล์ หรือทิงเจอร์ ไอโอดีน และรีบไปปรึกษาแพทย์ทันที

2. ถ้าสุนัขตายให้นำเข้ามาตรวจน้ำ ถ้าหากสุนัขไม่ตายให้ขึ้นป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ส่วนการรักษาทางสนูฟ ไฟฟ์หรือแพทย์แผนโบราณไม่สามารถป้องกันโรคได้ ไม่ควรลดอาการสุนัข เพราะอาจสายเกินไปที่จะฉีดวัคซีน

3. ในกรณีที่ติดตามสัตว์ที่กัดไม่ได้ เช่น เป็นสัตว์ป่า สัตว์จรจัด สัตว์กัดแล้วหนีไป หรือจำสัตว์ที่กัดไม่ได้จำเป็นต้องรับการฉีดวัคซีน

4. ผู้ที่ต้องมารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าต้อง มีบาดแผล ไม่ว่าจะเป็นรอยข้ามเขียวหรือมีเลือด "แหลม แผลคลอกหรือแผลลึก รวมทั้งผู้ที่ถูกสุนัขเลียที่นัยน์ตา ริมฝีปาก และผิวนานั้นที่มีแผลคลอก ส่วนในกรณีที่ถูกเลียผิวนั้นที่ไม่มีแผลหรือเพียงแต่อุ้มน้ำไม่สามารถจะติดโรคได้

ฉีดวัคซีน ห้องน้ำรีบดู ปลอดภัยไม่ถูกจับ



พระราชบัญญัติโรคพิษสุนัขบ้า พ.ศ.2535 กำหนดให้ สุนัขทุกตัวต้องได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ครั้งแรกตั้งแต่อายุ 2-4 เดือน ฉีดช้ำทุกปีหรือตามที่สัตว์แพทย์กำหนด ผู้ใดฝ่าฝืนไม่นำสัตว์ไปรับการฉีดวัคซีนต้อง ระหว่างโทษปรับ ไม่เกิน 200 บาท และต้องห้อยเครื่องญ แสดงการฉีดวัคซีนซึ่งจะมีสีต่างกันในแต่ละปี สุนัขที่พบใน ที่สาธารณะและไม่มีเครื่องหมายแสดงการฉีดวัคซีน หรือมี เครื่องหมายปลอม ถือว่าเป็นสุนัขจรจัด

นอกจากนี้ผู้ใดมีเครื่องหมายแสงดาวฉีดวัคซีนปลอม ต้องระหว่างโทษจำคุกไม่เกิน 1 เดือน หรือปรับไม่เกิน 1,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และผู้ใดขัดขวางหรือ ไม่อ่านว่าความสะอาดในการจัดสุนัขไม่มีเจ้าของในที่สาธารณะ หรือทำลายสุนัขที่เป็นโรคนี้ ต้องระหว่างโทษจำคุก ไม่เกิน 1 เดือน หรือปรับไม่เกิน 1,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ไม่ฉีด...ไม่ได้



สุนัขที่เลี้ยงอยู่แต่ภายในบ้านอาจได้รับเชื้อโรคพิษ สุนัขบ้าจากสุนัขที่อยู่นอกบ้านได้ เนื่องจากการต่อสู้ แย่งอาหาร แย่งตัวเมียในช่วงฤดูผสมพันธุ์สุนัขเป็น สัตว์ที่ช่างสงสัย เมื่อเวลาที่สุนัขอื่นเดินผ่านบริเวณร้า อาจยืนจมูกหรือปากออกไปเพื่อสำรวจด้วยความอยากรู้อยากเห็น หรือแสดงความเป็นเจ้าถิ่น จึงอาจถูกกัด และได้รับเชื้อโรคพิษสุนัขบ้าจากสุนัขจรจัดเหล่านั้น ได้ ดังนั้นสุนัข ทุกตัวจึงต้องได้รับการฉีดวัคซีนป้องกัน โรคพิษสุนัขบ้า

สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า



ด้วยความห่วงใยจาก
องค์กรอนามัยโลก

องค์กรอนามัยโลก

โทร.073-203610 โทรสาร 073-203621